

Corrigé du DM n° 2 de mathématiques

Ce DM propose d'étudier la suite $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$ définie par :

$$\forall n \geq 1, \quad \mathcal{F}_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1-k}{k}.$$

1. (a) Construire les dix premières lignes du triangle de Pascal.

► Voir la réponse à la question suivante.

(b) Dans le triangle de Pascal précédent, pour chaque valeur de l'entier n de 1 à 10, regrouper, en les entourant, tous les coefficients binomiaux qui apparaissent dans la somme \mathcal{F}_n .

►

Le triangle de Pascal est représenté ci-dessous. Les dix premières diagonales de coefficients sont regroupées par des ovales rouges et étiquetées de \mathcal{F}_1 à \mathcal{F}_{10} en rouge. Les coefficients sont alignés sur des lignes horizontales, et les diagonales sont parallèles à la diagonale principale du triangle.

1									
1	1								
1	2	1							
1	3	3	1						
1	4	6	4	1					
1	5	10	10	5	1				
1	6	15	20	15	6	1			
1	7	21	35	35	21	7	1		
1	8	28	56	70	56	28	8	1	
1	9	36	84	126	126	84	36	9	1

On remarque que chaque terme de la suite $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$ correspond à la somme des coefficients binomiaux situés sur une diagonale du triangle de Pascal.

(c) En déduire les valeurs des dix premiers termes de la suite $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$ puis conjecturer une relation de récurrence linéaire d'ordre deux vérifiée par les termes de la suite $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$.

► D'après le triangle de Pascal de la question précédente, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1 &= \boxed{1}, \\ \mathcal{F}_2 &= \boxed{1}, \\ \mathcal{F}_3 &= 1 + 1 = \boxed{2} = 1 + 1 = \mathcal{F}_2 + \mathcal{F}_1, \\ \mathcal{F}_4 &= 1 + 2 = \boxed{3} = 2 + 1 = \mathcal{F}_3 + \mathcal{F}_2, \\ \mathcal{F}_5 &= 1 + 3 + 1 = \boxed{5} = 3 + 2 = \mathcal{F}_4 + \mathcal{F}_3, \\ \mathcal{F}_6 &= 1 + 4 + 3 = \boxed{8} = 5 + 3 = \mathcal{F}_5 + \mathcal{F}_4, \\ \mathcal{F}_7 &= 1 + 5 + 6 + 1 = \boxed{13} = 8 + 5 = \mathcal{F}_6 + \mathcal{F}_5, \\ \mathcal{F}_8 &= 1 + 6 + 10 + 4 = \boxed{21} = 13 + 8 = \mathcal{F}_7 + \mathcal{F}_6, \\ \mathcal{F}_9 &= 1 + 7 + 15 + 10 + 1 = \boxed{34} = 21 + 13 = \mathcal{F}_8 + \mathcal{F}_7, \\ \mathcal{F}_{10} &= 1 + 8 + 21 + 20 + 5 = \boxed{55} = 34 + 21 = \mathcal{F}_9 + \mathcal{F}_8.\end{aligned}$$

On conjecture donc la relation de récurrence linéaire d'ordre 2 suivante :

$$\forall n \geq 1, \quad \boxed{\mathcal{F}_{n+2} = \mathcal{F}_{n+1} + \mathcal{F}_n}.$$

2. Info. On écrira les fonctions demandées en Python.

(a) Écrire une fonction `fact` qui prend en argument un entier $n \in \mathbb{N}$ et qui renvoie sa factorielle $n!$.

► Par exemple :

```
def fact(n):
    P=1
    for k in range(1,n+1):
        P=P*k
    return P
```

(b) Écrire une fonction `coeffbi` qui prend en argument deux entiers $k \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ et qui renvoie le coefficient binomial $\binom{n}{k}$.

► Par exemple :

```
def coeffbi(k,n):
    if k<0 or k>n:
        return 0
    else:
        return fact(n)/(fact(k)*fact(n-k))
```

(c) Écrire une fonction `suiteF` qui prend en argument un entier $n \geq 1$ et qui renvoie \mathcal{F}_n .

► Par exemple :

```
def suiteF(n):
    S=0
    for k in range(n):
        S=S+coeffbi(k,n-1-k)
    return S
```

(d) Vérifier la relation de récurrence conjecturée à la question 1 au rang $n = 42$.

► La relation de récurrence conjecturée à la question 1 s'écrit pour $n = 42$:

$$\mathcal{F}_{44} = \mathcal{F}_{43} + \mathcal{F}_{42}.$$

On peut vérifier cette conjecture en calculant \mathcal{F}_{42} , \mathcal{F}_{43} et \mathcal{F}_{44} à l'aide de la fonction de la question précédente. On obtient avec Python :

```

>>> suiteF(42)
267914296.0

>>> suiteF(43)
433494437.0

>>> suiteF(44)
701408733.0

>>> suiteF(42)+suiteF(43)
701408733.0

```

Donc, la relation de récurrence conjecturée à la question 1 est vraie au rang $n = 42$.

3. Démontrer la relation de récurrence conjecturée à la question 1.

► Soit $n \geq 1$. On a :

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_{n+1} + \mathcal{F}_n &= \sum_{k=0}^{(n+1)-1} \binom{(n+1)-1-k}{k} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1-k}{k} \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-(1+k)}{k} \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k} + \sum_{\ell=1}^n \binom{n-\ell}{\ell-1} \quad \text{en posant } \ell = 1+k \iff k = \ell-1 \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k-1} - \underbrace{\binom{n-0}{0-1}}_{=0} \quad \text{en posant } k = \ell \\
&= \sum_{k=0}^n \left(\underbrace{\binom{n-k}{k} + \binom{n-k}{k-1}}_{=\binom{n-k+1}{k}} \right) \quad \text{par linéarité} \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n-k+1}{k} \quad \text{d'après la formule de Pascal} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1-k}{k} - \underbrace{\binom{n+1-(n+1)}{n+1}}_{=0} \\
&= \sum_{k=0}^{(n+2)-1} \binom{(n+2)-1-k}{k} = \mathcal{F}_{n+2}.
\end{aligned}$$

On a donc bien démontré la relation de récurrence conjecturée à la question 1 :

$$\forall n \geq 1, \quad \boxed{\mathcal{F}_{n+2} = \mathcal{F}_{n+1} + \mathcal{F}_n}.$$

4. Dans un ouvrage publié en 1202 (l'un des premiers à recommander l'usage des chiffres arabes au lieu des chiffres romains), le mathématicien italien Leonardo Fibonacci a posé le problème suivant :

« En partant d'un couple de lapins engendré au début du premier mois, combien de couples de lapins obtient-on au bout d'une année si chaque couple engendre après deux mois d'existence un nouveau couple par mois ? »

Pour tout entier $n \geq 1$, on note c_n le nombre de couples de lapins à la fin du n -ième mois.

(a) Calculer les valeurs des six premiers termes de la suite $(c_n)_{n \geq 1}$ et comparer avec celles des premiers termes de la suite $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$. Quelle conjecture peut-on formuler ?



- À la fin du 1^{er} mois, le couple de lapins de départ n'a pas encore engendré, donc $c_1 = 1 = \mathcal{F}_1$.
- À la fin du 2^e mois, le couple de lapins de départ n'a toujours pas engendré car il n'a pas encore atteint deux mois complets d'existence, donc $c_2 = 1 = \mathcal{F}_2$.
- Au début du 3^e mois, le couple de lapins de départ a engendré un nouveau couple de lapins. À la fin du 3^e mois, ce nouveau couple de lapins n'a pas encore engendré, donc $c_3 = 1 + 1 = 2 = \mathcal{F}_3$.
- Au début du 4^e mois, le couple de lapins de départ a engendré un nouveau couple de lapins. À la fin du 4^e mois, ce nouveau couple de lapins n'a pas encore engendré et le couple de lapins engendré le 3^e mois n'a toujours pas engendré, donc $c_4 = 2 + 1 = 3 = \mathcal{F}_4$.
- Au début du 5^e mois, le couple de lapins de départ et le couple de lapins engendré le 3^e mois ont engendré chacun un nouveau couple de lapins. À la fin du 5^e mois, ces deux nouveaux couples de lapins n'ont pas encore engendré et le couple de lapins engendré le 4^e mois n'a toujours pas engendré, donc $c_5 = 3 + 2 = 5 = \mathcal{F}_5$.
- Au début du 6^e mois, le couple de lapins de départ et les couples de lapins engendrés le 3^e et le 4^e mois ont engendré chacun un nouveau couple de lapins. À la fin du 6^e mois, ces trois nouveaux couples de lapins n'ont pas encore engendré et les deux couples de lapins engendrés le 5^e mois n'ont pas toujours pas engendré, donc $c_6 = 5 + 3 = 8 = \mathcal{F}_6$.

On conjecture donc que :

$$\forall n \geq 1, \quad c_n = \mathcal{F}_n.$$

N'hésitez pas à vous aider d'un schéma pour ce type de raisonnement.

(b) Expliquer pourquoi la suite $(c_n)_{n \geq 1}$ vérifie la même relation de récurrence que la suite $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$.

► Soit $n \geq 1$. Le nombre de couples de lapins à la fin du $(n+2)$ -ième mois (c'est-à-dire c_{n+2}) est égal à la somme du nombre de couples de lapins existant déjà à la fin du $(n+1)$ -ième mois (donc c_{n+1}) et du nombre de couples de lapins engendrés lors du $(n+2)$ -ième mois. Ce dernier nombre est égal au nombre de couples de lapins ayant au moins deux mois d'existence à la fin du $(n+2)$ -ième mois, donc au nombre de couples de lapins existant déjà à la fin du n -ième mois (donc c_n). Par conséquent :

$$\forall n \geq 1, \quad c_{n+2} = c_{n+1} + c_n.$$

Ainsi $(c_n)_{n \geq 1}$ vérifie la même relation de récurrence que $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$.

(c) En déduire la réponse au problème de Fibonacci.

► La réponse au problème de Fibonacci est c_{12} . Or on a d'après les résultats précédents :

$$\begin{aligned} c_7 &= c_6 + c_5 = 8 + 5 = 13 \\ c_8 &= c_7 + c_6 = 13 + 8 = 21 \\ c_9 &= c_8 + c_7 = 21 + 13 = 34 \\ c_{10} &= c_9 + c_8 = 34 + 21 = 55 \\ c_{11} &= c_{10} + c_9 = 55 + 34 = 89 \\ c_{12} &= c_{11} + c_{10} = 89 + 55 = \boxed{144}. \end{aligned}$$

(d) À l'aide du résultat de la question 4(b), prouver la conjecture de la question 4(a).

► On raisonne par récurrence double pour montrer que $c_n = \mathcal{F}_n$ pour tout entier $n \geq 1$.

Initialisation. On a montré que $c_1 = \mathcal{F}_1$ et $c_2 = \mathcal{F}_2$ à la question 4(a), donc la conjecture est vraie pour $n = 1$ et $n = 2$.

Hérédité. On suppose que $c_n = \mathcal{F}_n$ et $c_{n+1} = \mathcal{F}_{n+1}$ pour un entier $n \geq 1$ fixé. Alors :

$$\begin{aligned} c_{n+2} &= c_{n+1} + c_n \quad \text{d'après la relation de récurrence prouvée à la question 4(b)} \\ &= \mathcal{F}_{n+1} + \mathcal{F}_n \quad \text{par hypothèses de récurrence} \\ &= \mathcal{F}_{n+2} \quad \text{d'après la relation de récurrence prouvée à la question 3.} \end{aligned}$$

On vient donc de montrer que :

$$(c_n = \mathcal{F}_n \text{ et } c_{n+1} = \mathcal{F}_{n+1}) \implies (c_{n+2} = \mathcal{F}_{n+2})$$

et cette implication est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

Conclusion. D'après le principe de récurrence double, on en déduit bien que :

$$\forall n \geq 1, \quad \boxed{c_n = \mathcal{F}_n}.$$

5. (a) *Info.* Écrire une fonction `sommeF` qui prend en argument un entier $n \geq 1$ et qui renvoie la somme des n premiers termes de la suite $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$.

► Par exemple :

```
def sommeF(n):
    S=0
    for k in range(1,n+1):
        S=S+suiteF(k)
    return S
```

(b) *Info.* Tester la fonction précédente pour chaque valeur de l'entier n de 1 à 10. Quelle conjecture peut-on formuler ? Vérifier cette conjecture au rang $n = 42$.

► On obtient :

```
>>> sommeF(1)
1.0

>>> sommeF(2)
2.0

>>> sommeF(3)
4.0

>>> sommeF(4)
7.0

>>> sommeF(5)
12.0
```

```
>>> sommeF(6)
20.0

>>> sommeF(7)
33.0

>>> sommeF(8)
54.0

>>> sommeF(9)
88.0

>>> sommeF(10)
143.0
```

Or on a déjà vu que :

$$\begin{cases} \mathcal{F}_3 = 2 \\ \mathcal{F}_4 = 3 \\ \mathcal{F}_5 = 5 \\ \mathcal{F}_6 = 8 \\ \mathcal{F}_7 = 13 \end{cases} \quad \begin{cases} \mathcal{F}_8 = 21 \\ \mathcal{F}_9 = 34 \\ \mathcal{F}_{10} = 55 \\ \mathcal{F}_{11} = 55 + 34 = 89 \\ \mathcal{F}_{12} = 89 + 55 = 144. \end{cases}$$

On conjecture donc que :

$$\forall n \geq 1, \quad \boxed{\sum_{k=1}^n \mathcal{F}_k = \mathcal{F}_{n+2} - 1}.$$

Pour $n = 42$, on obtient avec Python :

```
>>> sommeF(42)
701408732.0

>>> suiteF(44)
701408733.0
```

Donc $\boxed{\text{la conjecture est vraie pour } n = 42}$.

(c) À l'aide du résultat de la question 3, démontrer la conjecture précédente.

► Soit $n \geq 1$. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \mathcal{F}_k &= \sum_{k=1}^n (\mathcal{F}_{k+2} - \mathcal{F}_{k+1}) \quad \text{d'après le résultat de la question 3} \\ &= \mathcal{F}_{n+2} - \mathcal{F}_2 \quad \text{en reconnaissant une somme télescopique.} \end{aligned}$$

Or $\mathcal{F}_2 = 1$, donc :

$$\forall n \geq 1, \quad \boxed{\sum_{k=1}^n \mathcal{F}_k = \mathcal{F}_{n+2} - 1.}$$

On peut aussi démontrer le résultat par récurrence, mais c'est plus long.

6. (a) Exprimer le terme général \mathcal{F}_n en fonction de l'entier $n \geq 1$ et prouver que :

$$\forall n \geq 1, \quad \mathcal{F}_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^n - (-1/\varphi)^n \right)$$

où $\varphi > 1$ est une constante à déterminer.

► D'après le résultat de la question 3, la suite $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$ est récurrente linéaire d'ordre 2. Son équation caractéristique d'inconnue $q \in \mathbb{C}$ est :

$$q^2 = q + 1 \iff q^2 - q - 1 = 0.$$

On reconnaît une équation du second degré de discriminant $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 5 > 0$ donc elle admet deux solutions réelles distinctes : $q_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $q_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Ainsi, on sait qu'il existe deux constantes $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ telles que :

$$\forall n \geq 1, \quad \mathcal{F}_n = \lambda_1 q_1^{n-1} + \lambda_2 q_2^{n-1}.$$

Or on a pour $n = 1$ et $n = 2$:

$$\begin{cases} 1 = \mathcal{F}_1 = \lambda_1 q_1^{1-1} + \lambda_2 q_2^{1-1} = \lambda_1 + \lambda_2 & (L_1) \\ 1 = \mathcal{F}_2 = \lambda_1 q_1^{2-1} + \lambda_2 q_2^{2-1} = \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 & (L_2) \end{cases}$$

En effectuant l'opération $q_2(L_1) - (L_2)$, on obtient :

$$\begin{aligned} q_2 - 1 &= q_2(\lambda_1 + \lambda_2) - (\lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2) \\ &= (q_2 - q_1)\lambda_1 \quad \text{donc} \quad \lambda_1 = \frac{q_2 - 1}{q_2 - q_1} = \frac{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}}{\frac{-2\sqrt{5}}{2}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{q_1}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

En injectant dans (L_1) , on obtient :

$$\lambda_2 = 1 - \lambda_1 = 1 - \frac{q_1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5} - \frac{1+\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{-q_2}{\sqrt{5}}.$$

Par conséquent :

$$\forall n \geq 1, \quad \mathcal{F}_n = \frac{q_1}{\sqrt{5}} q_1^{n-1} + \frac{-q_2}{\sqrt{5}} q_2^{n-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(q_1^n - q_2^n \right).$$

D'autre part, $\sqrt{5} > \sqrt{4} = 2$ car la fonction racine carrée est strictement croissante, donc $q_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} > \frac{3}{2} > 1$ et $q_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} < -\frac{1}{2}$. De plus, $q_1 + q_2 = 1$ et $q_1 q_2 = -1$ car q_1 et q_2 sont les deux solutions de l'équation $q^2 - q - 1 = 0$.

Pensez à utiliser les relations entre coefficients et racines d'un polynôme de second degré afin d'éviter les calculs inutiles et de gagner du temps.

En particulier $q_2 = -1/q_1$ car $q_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \neq 0$. Finalement, on a bien :

$$\forall n \geq 1, \quad \boxed{\mathcal{F}_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^n - (-1/\varphi)^n \right)} \quad \text{en posant} \quad \boxed{\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1}.$$

(b) À l'aide de la formule du binôme de Newton, en déduire que :

$$\forall n \geq 1, \quad \mathcal{F}_n = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} 5^k.$$

► Soit $n \geq 1$. On a d'après la formule du binôme de Newton :

$$\varphi^n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n = \frac{1}{2^n} (\sqrt{5}+1)^n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\sqrt{5})^k 1^{n-k} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^{k/2}$$

$$\text{et } (-1/\varphi)^n = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 5^{k/2}.$$

Puis en séparant les indices pairs et impairs :

$$\varphi^n = \frac{1}{2^n} \left(\sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell} 5^\ell + \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} 5^{\ell+1/2} \right)$$

$$\text{et } (-1/\varphi)^n = \frac{1}{2^n} \left(\sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell} 5^\ell - \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} 5^{\ell+1/2} \right).$$

On en déduit d'après le résultat de la question précédente que :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_n &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^n - (-1/\varphi)^n \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{2^n} \left(0 + 2 \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} 5^{\ell+1/2} \right) \right) \\ &= \frac{1}{5^{1/2}} \times \frac{2}{2^n} \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} 5^\ell \times 5^{1/2} \\ &= \boxed{\frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2k+1} 5^k}. \end{aligned}$$

7. On s'intéresse maintenant à la suite $(\tau_n = \mathcal{F}_{n+1}/\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$ des taux de croissance mensuels du nombre de couples de lapins dans le problème originel de Fibonacci.

(a) Info. Écrire une fonction `tauxF` qui prend en argument un entier $n \geq 1$ et qui renvoie τ_n .

► Par exemple :

```
def tauxF(n):
    return suiteF(n+1)/suiteF(n)
```

(b) Déterminer une fonction réelle $f : x \mapsto f(x)$ telle que $\tau_{n+1} = f(\tau_n)$ pour tout entier $n \geq 1$.

► Soit $n \geq 1$. On a :

$$\begin{aligned} \tau_{n+1} &= \frac{\mathcal{F}_{n+2}}{\mathcal{F}_{n+1}} = \frac{\mathcal{F}_{n+1} + \mathcal{F}_n}{\mathcal{F}_{n+1}} \quad \text{d'après la relation de récurrence prouvée à la question 3} \\ &= 1 + \frac{\mathcal{F}_n}{\mathcal{F}_{n+1}} = 1 + \frac{1}{\mathcal{F}_{n+1}/\mathcal{F}_n} = f(\tau_n) \quad \text{en posant} \quad \boxed{f : x \mapsto 1 + \frac{1}{x}}. \end{aligned}$$

(c) Étudier les variations de f ainsi que la position relative de sa courbe représentative \mathcal{C}_f par rapport à la droite \mathcal{D} d'équation $y = x$.

► La fonction f est définie et dérivable sur \mathbb{R}^* . On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

Donc f est strictement décroissante sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

Attention : f n'est pas strictement décroissante sur \mathbb{R}^ !! Lorsqu'on étudie le signe de la dérivée, on peut en déduire la monotonie de f seulement sur les intervalles où le signe de f' est constant (principe de Lagrange).*

Pour étudier la position relative de la courbe représentative \mathcal{C}_f par rapport à la droite \mathcal{D} d'équation $y = x$, on étudie le signe de la fonction suivante :

$$g : x \mapsto f(x) - x = 1 + \frac{1}{x} - x = \frac{x + 1 - x^2}{x} = \frac{-(x^2 - x - 1)}{x}.$$


On reconnaît le polynôme du second degré étudié à la question 4(b). Ses racines sont $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $-1/\varphi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. On en déduit le tableau des signes suivant :

x	$-\infty$	$-1/\varphi$	0	φ	$+\infty$
$x^2 - x - 1$	+	0	-	-	+
$-(x^2 - x - 1)$	-	0	+	+	-
x	-	-	0	+	+
$g(x)$	+	0	-	+	-

Ainsi, \mathcal{C}_f est au-dessus \mathcal{D} sur $] -\infty, -1/\varphi[\cup]0, \varphi[$ et au dessous sur $]-1/\varphi, 0[\cup]\varphi, +\infty[$.

(d) Sur un même graphique, représenter la courbe \mathcal{C}_f , la droite \mathcal{D} et les premiers termes de $(\tau_n)_{n \geq 1}$.

►



(e) Prouver que la suite $(\tau_n)_{n \geq 1}$ est bornée. Que peut-on dire à propos de sa monotonie ?

► Montrons par récurrence que $\tau_n \in [\tau_1, \tau_2]$ pour tout entier $n \geq 1$.

Initialisation. On a $\tau_1 \in [\tau_1, \tau_2]$ donc l'assertion est vraie pour $n = 1$.

Hérédité. On suppose que $\tau_n \in [\tau_1, \tau_2]$ pour un entier $n \geq 1$ fixé. Donc :

$$1 = \mathcal{F}_2/\mathcal{F}_1 = \tau_1 \leq \tau_n \leq \tau_2 = \mathcal{F}_3/\mathcal{F}_2 = 2.$$

Puisque la fonction f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$ d'après le tableau des variations de la question 7(b), on en déduit que :

$$2 = \tau_2 = f(\tau_1) \geq f(\tau_n) = \tau_{n+1} \geq f(\tau_2) = \tau_3 = \mathcal{F}_4/\mathcal{F}_3 = 3/2.$$

Donc $\tau_{n+1} \in [3/2, 2] \subset [1, 2] = [\tau_1, \tau_2]$. Ainsi, $\tau_n \in [\tau_1, \tau_2]$ implique que $\tau_{n+1} \in [\tau_1, \tau_2]$ et cette implication est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

Conclusion. D'après le principe de récurrence, on en déduit que $\tau_n \in [\tau_1, \tau_2]$ pour tout entier $n \geq 1$. En particulier, on a bien prouvé que la suite $(\tau_n)_{n \geq 1}$ est bornée.

Par contre, la suite $(\tau_n)_{n \geq 1}$ n'est ni croissante, ni décroissante car :

$$1 = \tau_1 \leq \tau_2 = 2 \quad \text{et} \quad 3/2 = \tau_3 \leq \tau_2 = 2.$$

(f) Conjecturer le comportement asymptotique de la suite $(\tau_n)_{n \geq 1}$ (c'est-à-dire le comportement de τ_n quand n tend vers $+\infty$) et démontrer cette conjecture à l'aide du résultat de la question 6(a).

► D'après le graphique de la question 7(d), on conjecture que la suite $(\tau_n)_{n \geq 1}$ converge vers φ car sa limite semble être l'abscisse du point d'intersection placé à droite de l'axe des ordonnées entre la courbe \mathcal{C}_f et la droite \mathcal{D} (donc la solution positive de l'équation $f(x) = x \iff g(x) = 0$ qu'on a résolue à la question 7(c)).

Soit $n \geq 1$. On a d'après le résultat de la question 6(a) :

$$\tau_n = \frac{\mathcal{F}_{n+1}}{\mathcal{F}_n} = \frac{\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^{n+1} - (-1/\varphi)^{n+1} \right)}{\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^n - (-1/\varphi)^n \right)} = \varphi \left(\frac{\varphi^n - \frac{(-1)^{n+1}}{\varphi^{n+2}}}{\varphi^n - \frac{(-1)^n}{\varphi^n}} \right) = \varphi \left(\frac{1 + \frac{(-1)^{n+1}}{\varphi^{2n+2}}}{1 - \frac{(-1)^n}{\varphi^{2n}}} \right).$$

Or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1$ d'après ce qu'on a vu à la question 6(a) donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi^{2n+2} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi^{2n} = +\infty$$

d'où par opérations sur les limites usuelles :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \tau_n = \varphi.$$

(g) Info. Vérifier le résultat précédent à l'aide de la fonction `tauxF`.

► En Python, on obtient par exemple pour $n = 42$:

```
>>> tauxF(42)
1.618033988749895

>>> import math

>>> (1+math.sqrt(5))/2
1.618033988749895
```

Donc τ_{42} et φ sont égaux à 10^{-15} près.