

DS 7 mathématiques

BCPST 1 2018-2019

-
- Durée : 3 heures.
 - Documents et calculatrice non autorisés.
 - Une importance est accordée à la clarté, à la concision et à la précision de la rédaction.
-

Problème 1 : étude d'intersections

Dans tout le problème, les sous-espaces vectoriels considérés sont inclus dans \mathbb{R}^4 et on note $0_{\mathbb{R}^4}$ le vecteur nul. Dans \mathbb{R}^4 , il existe cinq catégories de sous-espaces vectoriels :

- l'unique sous-espace vectoriel de dimension 0 qui est $\{0_{\mathbb{R}^4}\}$,
- les sous-espaces vectoriels de dimension 1 aussi appelés **droites vectorielles**,
- les sous-espaces vectoriels de dimension 2 aussi appelés **plans vectoriels**,
- les sous-espaces vectoriels de dimension 3,
- et \mathbb{R}^4 .

On rappelle que l'intersection de deux plans vectoriels de \mathbb{R}^4 est un espace vectoriel de dimension 2 (s'ils sont confondus), 1 (s'ils s'intersectent selon une droite vectorielle) ou bien 0 (si leur intersection contient seulement le vecteur nul).

On présente un problème qui a intéressé le mathématicien Hermann Schubert :

“étant donné E_1, E_2, F_1, F_2 quatre plans vectoriels de \mathbb{R}^4 tels que $E_1 \cap E_2$ et $F_1 \cap F_2$ sont égales à des droites vectorielles et les $E_i \cap F_j$ sont réduits à $\{0_{\mathbb{R}^4}\}$, décrire les plans vectoriels V tels que les $V \cap E_i$ et $V \cap F_i$ sont des droites vectorielles.”

Autrement dit, E_1, E_2, F_1, F_2 sont des sous-espaces vectoriels de dimension 2 de \mathbb{R}^4 vérifiant les hypothèses suivantes :

$$\begin{aligned} \dim(E_1 \cap E_2) &= \dim(F_1 \cap F_2) = 1, \\ \dim(E_1 \cap F_1) &= \dim(E_1 \cap F_2) = \dim(E_2 \cap F_1) = \dim(E_2 \cap F_2) = 0 \end{aligned} \tag{D}$$

et on cherche les sous-espaces vectoriels V de dimension 2 de \mathbb{R}^4 tels que :

$$\dim(V \cap E_1) = \dim(V \cap E_2) = \dim(V \cap F_1) = \dim(V \cap F_2) = 1. \tag{SC}$$

Ce problème se propose d'étudier un cas particulier du problème de Schubert. Dans la partie 1, on justifie que les E_1, E_2, F_1, F_2 donnés vérifient les hypothèses (D). Puis, dans la partie 2, on construit deux plans vectoriels V_1 et V_2 vérifiant (SC). Enfin, on montre que V_1 et V_2 sont les seuls plans vectoriels vérifiant (SC) dans la partie 3.

Partie 1 : présentation de l'exemple

On pose :

$$E_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - z - t = 0 \text{ et } 3x + y + 2z + t = 0\}, \quad E_2 = \text{vect}((3, 1, 2, -1), (-4, 0, -1, 1)),$$

$$F_1 = \text{vect}((2, -1, 1, -2), (1, 1, 3, 1)), \quad F_2 = \text{vect}((4, -3, 2, 1), (0, -4, -5, 1))$$

$$G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + 4t = 0 \text{ et } -y + z + t = 0\}.$$

1. (**INFO**) Écrire une fonction `est_dans_E1(L)` qui prend en argument une liste L de réels de longueur 4 et qui renvoie `True` si $(L[0], L[1], L[2], L[3])$ est un élément de E_1 et `False` sinon.
2. Déterminer une base de E_1 et montrer que E_1 est bien un plan vectoriel de \mathbb{R}^4 .
3. Montrer que E_2, F_1, F_2 sont bien des plans vectoriels.
4. Montrer que $G = E_2$.

5. Déterminer un système d'équations linéaires (S) tel que pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$, on ait :

$$(x, y, z, t) \in F_1 \Leftrightarrow (x, y, z, t) \text{ solution de } (S).$$

6. Trouver une base de $E_1 \cap E_2$ et calculer la dimension de $E_1 \cap E_2$. On pourra déterminer les éléments de E_2 vérifiant le système d'équations caractérisant les éléments de E_1 .
7. Trouver une base de $F_1 \cap F_2$ et calculer la dimension de $F_1 \cap F_2$.
8. Montrer que $\dim(E_1 \cap F_1) = \dim(E_1 \cap F_2) = \dim(E_2 \cap F_1) = \dim(E_2 \cap F_2) = 0$.
9. Conclure à l'aide des questions précédentes que E_1, E_2, F_1, F_2 vérifient bien les conditions (D).

Correction

1. Voici la fonction demandée :

```
def est_dans_E1(L) :
    if len(L)==4 :
        a=L[0]+2*L[1]-L[2]-L[3]
        b=3*L[0]+L[1]+2*L[2]+L[3]
        return (a==0) and (b==0)
    else :
        return
```

2. Donnons une représentation paramétrique de E_1 . Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$. On a

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + 2y - z - t & = 0 \\ 3x + y + 2z + t & = 0 \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - z - t & = 0 \\ 4x + 3y + z & = 0 \end{cases} \quad (L_2 \leftarrow L_2 + L_1) \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} t & = x + 2y - z \\ z & = -4x - 3y \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} t & = 5x + 5y \\ z & = -4x - 3y \end{cases} \end{aligned}$$

On en déduit que $E_1 = \{(x, y, -4x - 3y, 5x + 5y), (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$.

Donc $E_1 = \text{vect}((1, 0, -4, 5), (0, 1, -3, 5))$. $((1, 0, -4, 5), (0, 1, -3, 5))$ est donc une famille génératrice de E_1 .

Montrons que c'est une famille libre. Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\alpha(1, 0, -4, 5) + \beta(0, 1, -3, 5) = (0, 0, 0, 0).$$

D'où

$$(\alpha, \beta, -4\alpha - 3\beta, 5\alpha + 5\beta) = (0, 0, 0, 0)$$

Donc $\alpha = 0, \beta = 0$. On en déduit que $((1, 0, -4, 5), (0, 1, -3, 5))$ est libre.

Il en résulte que $\boxed{((1, 0, -4, 5), (0, 1, -3, 5)) \text{ est une base de } E_1}$.

E_1 admettant une base de cardinal 2, on en déduit que E_1 est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^4 de dimension 2. Autrement dit, $\boxed{E_1 \text{ est un plan vectoriel}}$.

3. On note \mathcal{C} la base canonique de \mathbb{R}^4 , $\mathcal{E}_2 = ((3, 1, 2, -1), (-4, 0, -1, 1))$, $\mathcal{F}_1 = ((2, -1, 1, -2), (1, 1, 3, 1))$ et $\mathcal{F}_2 = ((4, -3, 2, 1), (0, -4, -5, 1))$. Montrer que E_2, F_1, F_2 sont bien des plans vectoriels revient alors à montrer que les rangs des familles $\mathcal{E}_2, \mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ sont tous égaux à 2. Calculons leur rang à l'aide de la méthode du pivot appliquée à leur matrice représentative dans la base canonique. On a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{E}_2) = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -4 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Cette dernière matrice étant échelonnée en colonnes et de rang 2, on en déduit que \mathcal{E}_2 est de rang 2.
De même,

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F}_1) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Cette dernière matrice étant échelonnée en colonnes et de rang 2, on en déduit que \mathcal{F}_1 est de rang 2.
Enfin,

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F}_2) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & -4 \\ 2 & -5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Cette dernière matrice étant échelonnée en colonnes et de rang 2, on en déduit que \mathcal{F}_2 est de rang 2.

Des calculs précédents, on en déduit que E_2, F_1, F_2 sont des sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^4 de dimension 2.

Donc ce sont bien des plans vectoriels.

4. Montrons que $G = E_2$. Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$. On a

$$\begin{cases} x + y + 4t = 0 \\ -y + z + t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -y - 4t \\ y = -z - t \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = z - 3t \\ y = -z - t \end{cases}$$

On en déduit que G est égal à $\text{vect}((1, -1, 0, 1), (-3, -1, 0, 1))$. Ainsi, G est égal à un espace vectoriel engendré par deux éléments de \mathbb{R}^4 . Donc $\dim(G) \leq 2$. Montrons que $E_2 \subset G$.

Soit $(x, y, z, t) \in E_2$. Il existe alors $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$(x, y, z, t) = (3\alpha - 4\beta, \alpha, 2\alpha - \beta, -\alpha + \beta).$$

Donc

$$x + y + 4t = (3\alpha - 4\beta) + \alpha + 4(-\alpha + \beta) = 4\alpha - 4\beta - 4\alpha + 4\beta = 0$$

et

$$-y + z + t = -(\alpha) + (2\alpha - \beta) + (-\alpha + \beta) = -2\alpha + 2\alpha - \beta + \beta = 0.$$

Donc $(x, y, z, t) \in G$. D'où $E_2 \subset G$. Donc $\dim(E_2) \leq \dim(G)$. Or $\dim(E_2) = 2$. Donc $2 \leq \dim(G)$. Mais $2 \geq \dim(G)$. Il en résulte que $\dim(G) = 2 = \dim(E_2)$.

Il en résulte que $G = E_2$.

5. Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$.

$$(x, y, z, t) \in F_1 \Leftrightarrow \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \lambda(2, -1, 1, -2) + \mu(1, 1, 3, 1) = (x, y, z, t)$$

Autrement dit, (x, y, z, t) est un élément de F_1 si et seulement si le système d'équations

$$\begin{cases} 2\lambda + \mu = x \\ -\lambda + \mu = y \\ \lambda + 3\mu = z \\ -2\lambda + \mu = t \end{cases}$$

d'inconnu $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ admet des solutions. Résolvons ce système :

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} 2\lambda + \mu &= x \\ -\lambda + \mu &= y \\ \lambda + 3\mu &= z \\ -2\lambda + \mu &= t \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda + \mu &= x \\ -\lambda + \mu &= y \\ 4\mu &= y + z \\ 2\mu &= x + t \end{cases} && (L_4 \leftarrow L_4 + L_1, L_3 \leftarrow L_3 + L_2) \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda + \mu &= x \\ 3\mu &= 2y + x \\ 4\mu &= y + z \\ 2\mu &= x + t \end{cases} && (L_2 \leftarrow 2L_2 + L_1) \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda + \mu &= x \\ \mu &= 2y - t \\ 4\mu &= y + z \\ 2\mu &= x + t \end{cases} && (L_2 \leftarrow L_2 - L_4) \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda + \mu &= x \\ \mu &= 2y - t \\ 0 &= -7y + z + 4t \\ 0 &= x - 4y + 3t \end{cases} && (L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2, L_4 \leftarrow L_4 - 2L_2)
 \end{aligned}$$

De cette étude, on en déduit que $(x, y, z, t) \in F_1$ si et seulement si :

$$x - 4y + 3t = 0 \quad \text{et} \quad -7y + z + 4t = 0.$$

6. Soit $\lambda(3, 1, 2, -1) + \mu(-4, 0, -1, 1)$ un élément de E_2 . Cet élément est un élément de E_1 si et seulement si :

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} (3\lambda - 4\mu) + 2(\lambda) - (2\lambda - \mu) - (-\lambda + \mu) &= 0 \\ 3(3\lambda - 4\mu) + (\lambda) + 2(2\lambda - \mu) + (-\lambda + \mu) &= 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 4\lambda - 4\mu &= 0 \\ 13\lambda - 13\mu &= 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \lambda = \mu
 \end{aligned}$$

En posant $\lambda = \mu = 1$, on en déduit que $E_1 \cap E_2 = \text{vect}((-1, 1, 1, 0))$. Ce vecteur étant seul et non nul, on en déduit que la famille réduite à ce vecteur est une base de $E_1 \cap E_2$. Donc $\dim(E_1 \cap E_2) = 1$.

7. Soit $(x, y, z, t) \in F_1 \cap F_2$. Par définition, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tels que

$$\lambda(2, -1, 1, -2) + \mu(1, 1, 3, 1) = \alpha(4, -3, 2, 1) + \beta(0, -4, -5, 1) = (x, y, z, t)$$

Réolvons le système linéaire d'inconnus $\lambda, \mu, \alpha, \beta$ correspondant :

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} 2\lambda + \mu &= 4\alpha \\ -\lambda + \mu &= -3\alpha - 4\beta \\ \lambda + 3\mu &= 2\alpha - 5\beta \\ -2\lambda + \mu &= \alpha + \beta \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda + \mu &= 4\alpha \\ -\lambda + \mu &= -3\alpha - 4\beta \\ 4\mu &= -\alpha - 9\beta \\ 2\mu &= 5\alpha + \beta \end{cases} & (L_4 \leftarrow L_4 + L_1, L_3 \leftarrow L_3 + L_2) \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda + \mu &= 4\alpha \\ 3\mu &= -2\alpha - 8\beta \\ 4\mu &= -\alpha - 9\beta \\ 2\mu &= 5\alpha + \beta \end{cases} & (L_2 \leftarrow 2L_2 + L_1) \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda + \mu &= 4\alpha \\ 3\mu &= -2\alpha - 8\beta \\ 4\mu &= -\alpha - 9\beta \\ 0 &= 11\alpha + 11\beta \end{cases} & (L_4 \leftarrow 2L_4 - L_3) \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\lambda + \mu &= 4\alpha \\ 3\mu &= 6\alpha \\ 4\mu &= 8\alpha \\ \beta &= -\alpha \end{cases} & (\text{en substituant } \beta \text{ par } -\alpha) \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda &= \alpha \\ \mu &= 2\alpha \\ \beta &= -\alpha \end{cases}
 \end{aligned}$$

Donc $(x, y, z, t) \in F_1 \cap F_2$ si et seulement s'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que

$$(x, y, z, t) = \alpha(4, -3, 2, 1) - \alpha(0, -4, -5, 1) = \alpha(4, 1, 7, 0).$$

Il en résulte que $\boxed{F_1 \cap F_2 = \text{vect}((4, 1, 7, 0))}$. Ce vecteur étant seul et non nul, on en déduit qu'il forme une famille libre. Étant génératrice de $F_1 \cap F_2$, il en résulte que c'est une base. Donc $\boxed{\dim(F_1 \cap F_2) = 1}$.

8. Montrer que pour tout $(i, j) \in \{1, 2\}^2$, $\dim(E_i \cap F_j) = 0$ revient à montrer que chacune des intersections est réduite à $0_{\mathbb{R}^4}$.

Déterminons $E_1 \cap F_1$. Soit $(x, y, z, t) \in E_1 \cap F_1$.

(x, y, z, t) étant un élément de F_1 , il existe donc $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que : $(x, y, z, t) = \alpha(2, -1, 1, -2) + \beta(1, 1, 3, 1) = (2\alpha + \beta, -\alpha + \beta, \alpha + 3\beta, -2\alpha + \beta)$.

Or (x, y, z, t) est aussi un élément de E_1 . D'où

$$\begin{cases} x + 2y - z - t &= 0 \\ 3x + y + 2z + t &= 0 \end{cases}$$

Donc

$$\begin{cases} (2\alpha + \beta) + 2(-\alpha + \beta) - (\alpha + 3\beta) - (-2\alpha + \beta) &= 0 \\ 3(2\alpha + \beta) + (-\alpha + \beta) + 2(\alpha + 3\beta) + (-2\alpha + \beta) &= 0 \end{cases}$$

Autrement dit,

$$\begin{cases} \alpha - \beta &= 0 \\ 5\alpha + 11\beta &= 0 \end{cases}$$

D'où

$$\begin{cases} \alpha &= \beta \\ 16\beta &= 0 \end{cases}$$

Donc $\beta = 0$ et $\alpha = 0$. Il en résulte que $(x, y, z, t) = 0_{\mathbb{R}^4}$.

Par conséquent, $\boxed{E_1 \cap F_1 \text{ est réduit à } \{0_{\mathbb{R}^4}\}}$.

Déterminons de la même façon $E_1 \cap F_2$. Soit $(x, y, z, t) = \alpha(4, -3, 2, 1) + \beta(0, -4, -5, 1)$ un élément de $E_1 \cap F_2$. On a alors

$$\begin{cases} (4\alpha) + 2(-3\alpha - 4\beta) - (2\alpha - 5\beta) - (\alpha + \beta) & = 0 \\ 3(4\alpha) + (-3\alpha - 4\beta) + 2(2\alpha - 5\beta) + (\alpha + \beta) & = 0 \end{cases}$$

D'où

$$\begin{cases} -5\alpha - 4\beta & = 0 \\ 16\alpha - 13\beta & = 0 \end{cases}$$

Donc

$$\begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 16 & -13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de la matrice 2×2 étant égal à $5 \times 13 + 4 \times 16 > 0$, on en déduit que la matrice est inversible. En multipliant par l'inverse, on trouve que $\alpha = \beta = 0$. Donc $(x, y, z, t) = 0_{\mathbb{R}^4}$. Donc $E_1 \cap F_2 = \{0_{\mathbb{R}^4}\}$.

G étant égal à E_2 , décrire $G \cap F_1$ et $G \cap F_2$ revient à décrire $G \cap F_1$ et $G \cap F_2$.

On procède alors de la même façon que précédemment.

Soit $(x, y, z, t) = \alpha(2, -1, 1, -2) + \beta(1, 1, 3, 1) \in E_2 \cap F_1$. On a donc

$$x + y + 4t = 0 \text{ et } -y + z + t = 0.$$

D'où

$$\begin{cases} (2\alpha + \beta) + (-\alpha + \beta) + 4(-2\alpha + \beta) & = 0 \\ -(-\alpha + \beta) + (\alpha + 3\beta) + (-2\alpha + \beta) & = 0 \end{cases}$$

Donc

$$\begin{cases} -7\alpha + 6\beta & = 0 \\ 3\beta & = 0 \end{cases}$$

D'où $\alpha = \beta = 0$. Il en résulte que (x, y, z, t) est égal à $0_{\mathbb{R}^4}$. Donc $E_2 \cap F_1 = \{0_{\mathbb{R}^4}\}$.

Déterminons $E_2 \cap F_2$. Soit $(x, y, z, t) = \alpha(4, -3, 2, 1) + \beta(0, -4, -5, 1) \in E_2 \cap F_2$.

On a donc

$$4\alpha + (-3\alpha - 4\beta) + 4(\alpha + \beta) = 0 \text{ et } -(-3\alpha - 4\beta) + (2\alpha - 5\beta) + (\alpha + \beta) = 0.$$

D'où

$$5\alpha = 0 \text{ et } -8\beta = 0.$$

Donc $\alpha = \beta = 0$. Autrement dit, $(x, y, z, t) = 0_{\mathbb{R}^4}$. On en déduit que $E_2 \cap F_2 = \{0_{\mathbb{R}^4}\}$.

9. En résumé, d'après les questions 2 et 3, E_1, E_2, F_1, F_2 sont des plans vectoriels. D'après les questions 6 et 7, on a $\dim(E_1 \cap E_2) = \dim(F_1 \cap F_2) = 1$.

D'après la question 8, les intersections des $E_i \cap F_j$ sont réduits à $\{0_{\mathbb{R}^4}\}$.

Par conséquent, E_1, E_2, F_1, F_2 vérifient bien les conditions (D).

Partie 2 : construction de solutions

Dans la suite, on pose $e = (-1, 1, 1, 0)$ et $f = (4, 1, 7, 0)$. On a alors $\text{vect}(e) = E_1 \cap E_2$ et $\text{vect}(f) = F_1 \cap F_2$.

10. On pose $V_1 = \text{vect}(e, f)$. Montrer que V_1 est un plan vectoriel et qu'il vérifie les conditions (SC).

11. On pose :

$$E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 22y - 21z - 17t = 0\}, F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 27x + 25y - 19z + 5t = 0\}.$$

Montrer que E et F sont de dimension 3.

12. Montrer que $E_1 \subset E, E_2 \subset E, F_1 \subset F, F_2 \subset F$.

13. On pose $V_2 = E \cap F$.

(a) Montrer que V_2 est bien un plan vectoriel.

(b) Soient H un sous-espace vectoriel de dimension 3 de \mathbb{R}^4 et soient P et Q deux plans vectoriels différents. On suppose que $P \subset H$ et $Q \subset H$ et on note (p_1, p_2) une base de P et (q_1, q_2) une base de Q .

i. Justifier que $\dim(P \cap Q) \leq 1$.

- ii. Montrer que (p_1, p_2, q_1) ou (p_1, p_2, q_2) est une base de H . Quitte à échanger q_1 et q_2 , on suppose que (p_1, p_2, q_1) est une base de H .
- iii. En écrivant q_2 dans la base (p_1, p_2, q_1) montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $q_2 + \lambda q_1 \in P \cap Q$.
- iv. En déduire que $\dim(P \cap Q) = 1$.

(c) Déduire des questions précédentes que V_2 vérifie (SC).

Correction

10. On pose $V_1 = \text{vect}(e, f)$. Montrons que V_1 est un plan vectoriel. (e, f) étant une famille génératrice de V_1 , on en déduit que V_1 est de dimension au plus 2. Vérifions que cette famille est libre. Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\alpha(-1, 1, 1, 0) + \beta(4, 1, 7, 0) = (0, 0, 0, 0)$$

D'où $-\alpha + 4\beta = 0$ et $\alpha + \beta = 0$. Donc $\alpha = 4\beta$ et $5\beta = 0$. Il en résulte que $\alpha = \beta = 0$. Donc (e, f) est une famille libre.

Par conséquent, (e, f) est une base de V_1 et donc V_1 est bien un plan vectoriel.

Montrons que V_1 vérifie les conditions (SC).

e étant un élément de $E_1 \cap E_2$, les intersections $E_1 \cap F_1$ et $E_1 \cap F_2$ étant réduits à $\{0_{\mathbb{R}^4}\}$, on en déduit que e n'est ni un élément de F_1 ni un élément de F_2 . Donc $(V_1 \cap F_1)$ et $(V_1 \cap F_2)$ sont strictement inclus dans V_1 . Donc $\dim(V_1 \cap F_1) < 2$ et $\dim(V_1 \cap F_2) < 2$. De plus, $f \in V_1 \cap F_1$ et $f \in V_1 \cap F_2$. Donc $\text{vect}(f) \subset V_1 \cap F_1$ et $\text{vect}(f) \subset V_1 \cap F_2$. Donc $\dim(V_1 \cap F_1) \geq 1$ et $\dim(V_1 \cap F_2) \geq 1$. Il en résulte que $\dim(V_1 \cap F_1) = \dim(V_1 \cap F_2) = 1$.

De même, en échangeant les rôles de e et f , de E_1 et F_1 , de E_2 et F_2 , on obtient que :

$$\text{dim}(V_1 \cap E_1) = \text{dim}(V_1 \cap E_2) = 1.$$

11. Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$. On a

$$(x, y, z, t) \in E \Leftrightarrow x = 22y - 21z - 17t$$

et

$$(x, y, z, t) \in F \Leftrightarrow x = \frac{-25}{27}y + \frac{19}{27}z - \frac{5}{27}t$$

D'où

$$E = \text{vect}((22, 1, 0, 0), (-21, 0, 1, 0), (17, 0, 0, 1)) \text{ et } F = \text{vect}\left(\left(-\frac{25}{27}, 1, 0, 0\right), \left(\frac{19}{27}, 0, 1, 0\right), \left(\frac{-5}{27}, 0, 0, 1\right)\right)$$

Donc E et F sont des espaces vectoriels au plus de dimension 3. Montrons que ces familles génératrices sont bien de rang 3. Pour cela, il suffit de calculer le rang de leur matrice représentative dans la base canonique. En notant $\mathcal{E} = ((22, 1, 0, 0), (-21, 0, 1, 0), (17, 0, 0, 1))$ et $\mathcal{F} = \left(\left(-\frac{25}{27}, 1, 0, 0\right), \left(\frac{19}{27}, 0, 1, 0\right), \left(\frac{-5}{27}, 0, 0, 1\right)\right)$, on a alors

$$\begin{aligned} \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{E}) &= \begin{pmatrix} 22 & -21 & 17 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (L_1 \leftarrow L_1 - 22L_2 + 21L_3 - 17L_4) \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad L_4 \leftrightarrow L_1 \end{aligned}$$

La matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{E})$ étant de rang 3, on en déduit que \mathcal{E} est de rang 3, donc E est de dimension 3.

De même,

$$\begin{aligned} \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F}) &= \begin{pmatrix} -\frac{25}{27} & \frac{19}{27} & -\frac{5}{27} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (L_1 \leftarrow L_1 + \frac{25}{27}L_2 - \frac{19}{27}L_3 + \frac{5}{27}L_4) \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad L_4 \leftrightarrow L_1 \end{aligned}$$

La matrice $Mat_{\mathcal{C}}(\mathcal{F})$ étant de rang 3, on en déduit que \mathcal{F} est de rang 3, donc F est de dimension 3.

12. D'après la question 2, la famille $B_1 = ((1, 0, -4, 5), (0, 1, -3, 5))$ est une base de E_1 . De plus, $1 + 22 \times 0 - 21 \times (-4) - 17 \times 5 = 1 + 84 - 85 = 0$ et $1 \times 0 + 22 \times 1 - 21(-3) - 17 \times 5 = 22 + 63 - 85 = 0$. Donc B_1 est une famille de E . E étant un espace vectoriel, on a donc $\text{vect}(B_1) \subset E$. Autrement dit, $E_1 \subset E$.

En raisonnant de façon similaire pour E_2 :

$$3 + 22 \times 1 - 21 \times 2 - 17(-1) = 25 - 42 + 17 = 0, -4 + 22 \times 0 - 21 \times (-1) - 17 \times 1 = 0.$$

Donc $((3, 1, 2, -1), (-4, 0, -1, 1))$ est une famille de E et donc $\text{vect}((3, 1, 2, -1), (-4, 0, -1, 1))$ est inclus dans E . Autrement dit, $E_2 \subset E$.

De même, pour F_1 :

$$27 \times 2 + 25 \times (-1) - 19 \times 1 + 5 \times (-2) = 54 - 25 - 19 + 5 = 0, 27 \times 1 + 25 \times 1 - 19 \times 3 + 5 = 57 - 57 = 0.$$

Donc une famille génératrice de F_1 est une famille de F . D'où $F_1 \subset F$.

Enfin, pour F_2 :

$$27 \times 4 + 25 \times (-3) - 19 \times 2 + 5 \times 1 = 108 - 75 - 38 + 5 = 0, 27 \times 0 + 25 \times (-4) - 19 \times (-5) + 5 = -100 + 95 + 5 = 0.$$

Donc une famille génératrice de F_2 est une famille génératrice de F . D'où $F_2 \subset F$.

13. On pose $V_2 = E \cap F$.

- (a) Montrons que V_2 est bien un plan vectoriel. Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$. (x, y, z, t) est un élément de $E \cap F$ si et seulement si

$$\begin{cases} x + 22y - 21z - 17t = 0 \\ 27x + 25y - 19z + 5t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 22y - 21z - 17t = 0 \\ -569y + 592z + 459t = 0 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 27L_1$$

Il en résulte qu'il existe $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tel que

$$V_2 = \text{vect}((a, b, 1, 0), (c, d, 0, 1)).$$

Donc V_2 est au plus de dimension 2. Montrons que la famille $((a, b, 1, 0), (c, d, 0, 1))$ est libre. Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\lambda(a, b, 1, 0) + \mu(c, d, 0, 1) = (0, 0, 0, 0)$$

D'où, en regardant la troisième et la quatrième composantes : $\lambda = \mu = 0$.

La famille $((a, b, 1, 0), (c, d, 0, 1))$ est donc libre. Elle est aussi génératrice de V_2 , il en résulte que :

V_2 est bien un plan vectoriel.

- (b) Soient H un sous-espace vectoriel de dimension 3 de \mathbb{R}^4 et soient P et Q deux plans vectoriels différents. On suppose que $P \subset H$ et $Q \subset H$ et on note (p_1, p_2) une base de P et (q_1, q_2) une base de Q .

- i. P étant de dimension 2, on a $P \cap Q$ au plus de dimension 2. Or P et Q sont différents. Donc $P \cap Q$ est strictement inclus dans P . Donc $\dim(P \cap Q) \leq 1$.

- ii. Supposons que ni (p_1, p_2, q_1) ni (p_1, p_2, q_2) ne sont des bases de H . Il en résulte alors que ces deux familles sont liées. Autrement dit, il existe $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ et $(\mu_1, \mu_2, \mu_3) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ tels que

$$\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \lambda_3 q_1 = 0_{\mathbb{R}^4}, \mu_1 p_1 + \mu_2 p_2 + \mu_3 q_2 = 0_{\mathbb{R}^4}.$$

Or (p_1, p_2) étant une base elle est en particulier libre. Donc nécessairement, $\lambda_3 \neq 0, \mu_3 \neq 0$. D'où

$$q_1 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_3} p_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_3} p_2$$

et

$$q_2 = -\frac{\mu_1}{\mu_3} p_1 - \frac{\mu_2}{\mu_3} p_2.$$

Donc (q_1, q_2) est une famille de P . Or (q_1, q_2) étant une base de Q , elle est en particulier libre. Or $\text{Card}((q_1, q_2)) = \dim(P)$. Donc c'est une base de P . Mais c'est aussi une base de Q . D'où $P = Q$, ce qui contredit les hypothèses initiales.

En conclusion, (p_1, p_2, q_1) ou (p_1, p_2, q_2) est une base de H .

- iii. Par définition, q_2 est un élément de Q . Or Q est inclus dans H . Donc q_2 est un élément de H . (p_1, p_2, q_1) étant une base de H , il existe $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{R}^3$ tel que

$$q_2 = \alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2 + \alpha_3 q_1.$$

D'où

$$q_2 - \alpha_3 q_1 = \alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2.$$

En posant $\lambda = -\alpha_3 q_1$, le vecteur $q_2 + \lambda q_1$ est clairement un élément de Q . De plus, $q_2 + \lambda q_1$ est égal à $\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2$ qui est un élément de P .

Donc $q_2 + \lambda q_1$ est un élément de $P \cap Q$.

- iv. On sait que $q_2 + \lambda q_1$ est un élément de $P \cap Q$. De plus, (q_1, q_2) étant une base de Q , $q_2 + \lambda q_1$ est un élément non nul. Donc $(q_2 + \lambda q_1)$ est une famille libre de $P \cap Q$. D'où $\dim(P \cap Q) \geq 1$. Mais on a vu que $\dim(P \cap Q) \leq 1$.

Par conséquent, $\dim(P \cap Q) = 1$.

- (c) On a vu que V_2, E_1 et E_2 sont des plans vectoriels inclus dans E qui est de dimension 3. De plus, e est un élément de $E_1 \cap E_2$ mais n'est pas un élément de F . Donc e n'est pas un élément de V_2 . Ainsi, V_2 est différent de E_1 et de E_2 .

En appliquant le résultat de la question 13.b.iv, on en déduit que

$$\underline{\dim(V_2 \cap E_1) = 1, \dim(V_2 \cap E_2) = 1.}$$

De même, V_2, F_1, F_2 sont des plans vectoriels inclus dans F qui est de dimension 3. Et f est un élément de $F_1 \cap F_2$ mais n'est pas un élément de E . Donc f n'est pas un élément de V_2 . Ainsi, V_2 est différent de F_1 et de F_2 . En appliquant le résultat de la question 13.b.iv, on en déduit que

$$\underline{\dim(V_2 \cap F_1) = 1, \dim(V_2 \cap F_2) = 1.}$$

En conclusion, V_2 vérifie bien (SC).

Partie 3 : analyse du problème

On garde les notations introduites dans la partie 2.

Soit V un plan vectoriel vérifiant (SC). On veut montrer que $V = V_1$ ou $V = V_2$.

14. Justifier qu'il existe v_1, v_2, w_1, w_2 des éléments de $\mathbb{R}^4 \setminus \{0_{\mathbb{R}^4}\}$ tels que

$$\text{vect}(v_1) = V \cap E_1, \text{vect}(v_2) = V \cap E_2, \text{vect}(w_1) = V \cap F_1, \text{vect}(w_2) = V \cap F_2.$$

15. Montrer que $\text{vect}(v_1, v_2) \subset V \cap E$ et $\text{vect}(w_1, w_2) \subset V \cap F$.

16. (**INFO**) Écrire une fonction Python `est_libre(L, M)` qui prend en arguments deux listes L, M de réels de longueur 4 et qui renvoie `True` si $((L[0], L[1], L[2], L[3]), (M[0], M[1], M[2], M[3]))$ est une famille libre et `False` sinon.

17. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

- (a) (v_1, v_2) est liée,
- (b) e est un élément de V ,
- (c) V n'est pas inclus dans F ,
- (d) (w_1, w_2) est liée,
- (e) f est un élément de V ,
- (f) V n'est pas inclus dans E .

18. En déduire que (v_1, v_2) est une base de V si et seulement si (w_1, w_2) est une base de V .

19. Déduire des questions précédentes que $V = V_1$ ou $V = V_2$.

Correction

14. Les différentes intersections étant de dimension 1, elles admettent donc des bases de cardinal 1. Il existe donc v_1, v_2, w_1, w_2 des vecteurs non nuls de \mathbb{R}^4 tels que :

$$\text{vect}(v_1) = V \cap E_1, \text{vect}(v_2) = V \cap E_2, \text{vect}(w_1) = V \cap F_1, \text{vect}(w_2) = V \cap F_2.$$

15. Par définition, v_1 est un élément de E_1 et v_2 est un élément de E_2 . Or E_1 et E_2 sont inclus dans E . Donc v_1 et v_2 sont des éléments de E . D'où $\text{vect}(v_1, v_2)$ est inclus dans E . De plus, par définition v_1 et v_2 sont des éléments de V .

Donc $\text{vect}(v_1, v_2)$ est inclus dans V . D'où $\text{vect}(v_1, v_2)$ est inclus dans $V \cap E$.

De même, en remplaçant v_i par w_i , E_i par F_i et E par F dans le raisonnement précédent, on en déduit que

$\text{vect}(w_1, w_2)$ est inclus dans $V \cap F$.

16. Écrivons d'abord une fonction qui vérifie si une liste représente le vecteur nul :

```
def nul (L) :
    if len(L)==4 :
    for x in L :
        if x!=0 :
            return False
    return True
```

Voici la fonction `est_libre` :

```
def est_libre(L,M) :
    if len(L)==4 and len(M)==4 :
        if nul(L) or nul(M) :
            return False
        else :
            lam=0
            indiceL=0
            mu=0
            indiceM=0
            for i in range(4) :
                if L[i]!=0 :
                    indiceL=i
                    lam=L[i]
                if M[i]!=0 :
                    indiceM=i
                    mu=M[i]
            if indiceM!=indiceL :
                return True
            for i in range(4) :
                if mu*L[i]!=lam*M[i] :
                    return True
            return False
```

17. Pour montrer que ces propositions sont équivalentes, on montre qu'une proposition donnée implique la suivante, et que la dernière implique la première.

$(a \Rightarrow b)$ Supposons que (v_1, v_2) est une famille liée. Ces deux vecteurs n'étant pas nuls, il en résulte que $\text{vect}(v_1) = \text{vect}(v_2)$. D'où $V \cap E_1 = V \cap E_2$. Or $V \cap E_1$ est de dimension 1. Donc v_1 est un élément de $V \cap E_1$ et de $V \cap E_2$. D'où v_1 est un élément non nul de $E_1 \cap E_2 = \text{vect}(e)$. Donc $\text{vect}(e) = \text{vect}(v_1)$. Il en résulte que e est un élément $V \cap E_1$ et donc de V .

$(b \Rightarrow c)$ Supposons que e est un élément de V . Comme e n'est pas un élément de F , on en déduit que V n'est pas inclus dans F .

On montre $(c) \Rightarrow (d)$ par la contraposée. Supposons que (w_1, w_2) est libre. Il s'agit alors d'une famille libre de V qui est de dimension 2. Donc (w_1, w_2) est une base de V . Donc $V = \text{vect}(w_1, w_2)$. Or d'après la question 15, $\text{vect}(w_1, w_2)$ est inclus dans F . Il en résulte que V est inclus dans F .

($d \Rightarrow e$) Supposons que $((w_1, w_2)$ est liée. En raisonnant de la même façon que $a \Rightarrow b$ (on remplace e par f , v_i par w_i et E_i par F_i), on en déduit que $\text{vect}(f) = \text{vect}(w_1) = \text{vect}(w_2)$. Comme $\text{vect}(w_1) \subset V$, on en conclut que f est un élément de V .

($e \Rightarrow f$) Supposons que f est un élément de V . Comme f n'est pas un élément de E , on en déduit que V n'est pas inclus dans E .

On montre ($f \Rightarrow a$) par la contraposée. En raisonnant de la même façon que pour ($c \Rightarrow d$) (on remplace w_i par v_i et F par E), on en déduit que $V = \text{vect}(v_1, v_2) \subset E$.

18. De l'équivalence entre (a) et (d), on en déduit que

$$(v_1, v_2) \text{ est libre si et seulement si } (w_1, w_2) \text{ est libre.}$$

Mais ces familles de V ont le même cardinal que la dimension de V , à savoir 2. Elles sont donc libres si et seulement si ce sont des bases. D'où

$$\boxed{(v_1, v_2) \text{ est une base de } V \text{ si et seulement si } (w_1, w_2) \text{ est une base de } V.}$$

19. Deux cas peuvent alors se présenter.

— Cas 1 : (v_1, v_2) est une base de V .

Donc (w_1, w_2) est aussi une base de V . Il en résulte alors que $V = \text{vect}(v_1, v_2) \subset E$ et $V = \text{vect}(w_1, w_2) \subset F$.

Donc F est inclus dans $E \cap F = V_2$ qui est également de dimension 2. Donc $\boxed{V = V_2}$.

— Cas 2 : (v_1, v_2) est liée.

D'après les différentes équivalences, on en déduit que e et f sont des éléments de V . Donc $V_1 = \text{vect}(e, f) \subset V$.

Or V_1 et V ont la même dimension. Donc $\boxed{V = V_1}$.