

Feuille de TD n° 2

Nombres

Exercice 1

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$(E_1) \quad 3 - x = \frac{4}{x+1}$$

$$(E_2) \quad |2x - 4| = x + 1$$

$$(E_3) \quad \ln(x - 2) + \ln(x + 2) = \ln(3x)$$

$$(E_4) \quad m^2x^2 + 2mx = 3, \text{ en fonction du paramètre } m \in \mathbb{R}.$$

$$(E_5) \quad \sqrt{x-1} + \sqrt{x+4} = \sqrt{5}$$

Exercice 2

Résoudre les inéquations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$(I_1) \quad |2x + 3| \geq x + 3$$

$$(I_2) \quad -2x^2 + 7x - 5 \leq 0$$

$$(I_3) \quad x < \frac{1}{x}$$

$$(I_4) \quad 2e^{2x} - 7e^x - 15 > 0$$

$$(I_5) \quad \frac{x}{x-2} < \frac{6}{x-1}$$

Exercice 3

ATTENTION : la calculatrice est interdite pour cet exercice !

Pour tout réel $x \in \mathbb{R}$ et tout entier $n \in \mathbb{Z}$ on définit l'approximation décimale de x par défaut à 10^{-n} près par : $A_n(x) = 10^{-n} \lfloor 10^n x \rfloor$.

1. Vérifier que $A_n(x) \leq x$.
2. Donner un majorant Δ de l'écart entre x et $A_n(x)$.
3. Peut-on avoir $A_n(x) = x$? Et $x - A_n(x) = \Delta$?
4. Sachant que $A_3(\sqrt{2}) = 1,414$, déterminer $A_2(\sqrt{2})$ et $A_2(-\sqrt{2})$.
5. Sachant que $A_3(e) = 2,718$, déterminer $A_2(e + \sqrt{2})$ et $A_2(e - \sqrt{2})$.
6. Déterminer $A_2(e\sqrt{2})$ et $A_2\left(\frac{e}{\sqrt{2}}\right)$.

Exercice 4

Soient a et b deux nombres réels tels que $0 \leq b \leq a \leq 2b$. Simplifier l'expression suivante :

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}\sqrt{a-b}} + \sqrt{a - 2\sqrt{b}\sqrt{a-b}}.$$

Exercice 5

Pour chacun des ensembles suivants donner, s'ils existent, le plus petit élément, le plus grand élément, la borne inférieure et la borne supérieure.

$$A = [0, 1] \cup]2, +\infty[$$

$$B =]-1, 0[\cup \{1\}$$

$$C = \left\{ \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$D = \{0, -1, 2, -3, 4, -5, 6, -7, \dots\}$$

$$E = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$F = \{x \in \mathbb{R} \mid \lfloor 1 - x \rfloor = 2\}$$

Exercice 6

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$(E_1) \quad \lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$$

$$(E_2) \quad |x - 1| = |2x - 5|$$

$$(E_3) \quad x + \sqrt{2x + 1} = 1$$

$$(E_4) \quad \ln((x + 2)(x - 2)) = \ln(2x + 11)$$

$$(E_5) \quad \ln(x + 2) + \ln(x - 2) = \ln(2x + 11)$$

$$(E_6) \quad 2e^{-x} - 6e^x = 1$$

$$(E_7) \quad x^2 - 2mx - m + 6 = 0, \text{ en fonction du paramètre } m \in \mathbb{R}$$

$$(E_8) \quad (\ln(x))^2 + 3\ln(x) + 2 = 0$$

$$(E_9) \quad x^{x^3} = x^{3x}$$

Exercice 7

Résoudre les inéquations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$(I_1) \quad x + \frac{1}{x} \geq 0$$

$$(I_2) \quad |3x - 1| > |x + 2|$$

$$(I_3) \quad (\ln(x))^2 > 1$$

$$(I_4) \quad \sqrt{(x + 3)(x - 1)} \geq 2x - 1$$

$$(I_5) \quad e^{-2x} - e^{-x} > 0$$

$$(I_6) \quad \frac{4x^2 - 15x - 3}{2x^2 - 5x - 3} \geq 1$$

$$(I_7) \quad \ln(2x) \geq \ln(x^2 - 1)$$

$$(I_8) \quad \sqrt{\frac{x+1}{x-2}} < 1$$

$$(I_9) \quad \frac{5}{x+9} - \frac{2}{2x+3} > \frac{7}{9(x+1)}$$

Exercice 8

Déterminer chacun des sous-ensembles de \mathbb{C} suivants :

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_1 &= \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = |z - 6 + 5i|\} & \mathcal{S}_2 &= \{z \in \mathbb{C} \mid z(2\bar{z} + 1) = 1\} \\ \mathcal{S}_3 &= \left\{z \in \mathbb{C} \mid \frac{z + 4i}{5z - 3} \in \mathbb{R}\right\} & \mathcal{S}_4 &= \left\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}\left(\frac{z - 1}{z + 1}\right) = 0\right\} \end{aligned}$$

Exercice 9

Montrer que $\forall (z, w) \in \mathbb{C}^2, \quad |z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$.

Exercice 10

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

$$(E_1) \quad z^2 + 29 = 10z$$

$$(E_2) \quad z + \frac{1}{z} = 1$$

$$(E_3) \quad z^3 - 3z^2 + 5z = 3$$

$$(E_4) \quad 4z^2 + 12mz + 36m + 48 = 3, \text{ en fonction du paramètre } m \in \mathbb{R}$$

$$(E_5) \quad z^7 = z$$

Exercice 11

Déterminer tous les couples $(u, v) \in \mathbb{C}^2$ de nombres complexes tels que :

$$u + v = 4 \quad \text{et} \quad uv = 2(\sqrt{5} - 1).$$

Exercice 12

Ecrire les nombres complexes suivants sous forme exponentielle :

$$\begin{aligned} z_1 &= \left(-1 + i\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^6 & z_2 &= (\cos(\theta) - i\sin(\theta))^4 \quad (\text{où } \theta \in \mathbb{R}) \\ z_3 &= \frac{6 - 4i}{5 + i} & z_4 &= \frac{11 + 3i}{1 + i} \end{aligned}$$

Exercice 13

Pour tout couple $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, écrire le nombre complexe suivant sous forme exponentielle :

$$z = (\cos(\alpha) + \sin(\beta)) + i(\sin(\alpha) + \cos(\beta)).$$